

21036

by Dandi Sudarmanto

Submission date: 18-Sep-2023 10:00PM (UTC-0700)

Submission ID: 2170366368

File name: jurnal_dandi_agroista.docx (1.3M)

Word count: 2348

Character count: 14365

Evaluasi Serangan Rayap Di Perkebunan Kelapa Sawit Pada Jenis Tanah Yang Berbeda

Dandi Sudarmanto, Idum Satya Santi², Samsuri Tarmaja

Program Studi Agroteknologi Fakultas pertanian, INSTIPER Yogyakarta

*E-mail penulis : idum@instiperjogja.ac.id

ABSTRACT

Termites are one of the pests in oil palm plantations that can cause physical damage to oil palm plants. This study aims to determine the type and population of termites in mineral, peat and pasiran soils and the effectiveness of their control. This research was conducted at PT Binasawit Abadipratama located in Danau Seluluk District, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province, namely Kebun Tangar from March to April 2023. The research was conducted using a comparative method by comparing termite populations in mineral soil, peat and pasiran with parameters in the form of termite species and the level of attack expressed by scoring, as well as secondary data in the form of termite census data in the garden archive to determine the effectiveness of control. The results showed that the largest termite population was found in mineral soil, the termite species found in all soil types was *Macrotermes gilvus*, and no termite infestation was found. Based on the census data for the past three years, it can be concluded that the control that has been carried out is effective in reducing the termite population from year to year.

Keywords: Termites; Palm Oil; Pest Control

PENDAHULUAN

Rayap merupakan hama yang tidak asing lagi terutama di perkebunan kelapa sawit. Rayap dapat menimbulkan kerusakan fisik secara langsung pada tanaman yang mana kerusakan ini menyebabkan terganggunya proses fisiologis pada tanaman hingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan hasil yang berdampak pada kerugian ekonomis yang cukup besar. Persentase serangan rayap pada tanaman kelapa sawit mencapai 10,8%, tanaman karet 7,4%, tanaman sengon 7,46% (Yatina dkk, 2006). Di Indonesia kerugian yang disebabkan oleh rayap tiap tahun tercatat sekitar Rp. 224 miliar– Rp. 238 miliar (Prasetyo, 2004). Nandika dkk (2015) memperkirakan bahwa kerugian ekonomis akibat serangan rayap di Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai Rp 8.7 triliun. Rayap merupakan hama

penting pada tanaman kelapa sawit di areal bukaan baru khususnya yang ditanam pada areal gambut (Bakti, 2004).

Rayap yang sering dijumpai di perkebunan kelapa sawit adalah jenis rayap tanah. Rayap jenis ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi terhadap kondisi lingkungan, hal ini dapat menyebabkan penyebarannya sangat luas. Apabila tidak dikendalikan dengan cepat, serangan rayap ini akan menyebabkan kerusakan dan masalah bagi seluruh tanaman budidaya, sehingga akibat yang ditimbulkan sangat besar, menyebabkan kerusakan fisik secara langsung dan penurunan produksi pada tanaman kelapa sawit, sehingga dampak kerugian ekonomis yang ditimbulkan sangat besar (Toni dkk, 2015).

Spesies rayap yang umum ditemui dan menyebabkan kerusakan di perkebunan kelapa sawit adalah spesies *Coptotermes curvignathus* dan *Macrotermes gilvus* (Savitri dkk, 2016). Jenis rayap *Coptotermes curvignathus* merupakan rayap dengan famili *Temitidae* yang dapat menyebabkan kerusakan fisik secara langsung pada tanaman kelapa sawit yang mana rayap ini dapat memakan jaringan hdiup pada tanaman kelapa sawit. Rayap *Coptotermes curvignathus* umumnya merupakan hama di perkebunan kelapa sawit khususnya pada lahan gambut. Jenis rayap *Macrotermes gilvus* merupakan jenis rayap dari famili *Rhinotermitidae* tidak menimbulkan kerusakan fisik secara langsung pada tanaman kelapa sawit namun apabila rayap ini membangun sarang pada area perakaran tanaman kelapa sawit dapat menyebabkan perakaran terganggu dan tanaman menjadi doyong/miring bahkan tumbang (Nandika, 2014).

Untuk menangani serangan rayap diperkebunann kelapa sawit dilakukan pengendalian baik itu secara mekanis maupun cara kimiawi. Di tempat penelitian inbi dilakukan yakni Perkebunan Tangar, pengendalian yang telah dilakukan adalah dengan pegendalian mekanis, yakni dengan menggunakan alat berupa cados. Pengendalian ini dilakukan dengan membongkar sarang rayap kemudian mengambil ratu rayap kemudian selanjutnya ratu rayap diambil kemudian dikumpulkan di kanfor divisi sebagai bukti pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT Binasawit Abadipratama, Tangar Estate, Desa Rungau Raya , Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Divisi 1, 5 dan 6 yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023 s/d April 2023. Metode penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu dengan membandingkan populasi dan jenis spesies rayap yang ada pada perkebunan kelapa sawit dengan jenis tanah yang berbeda yakni mineral, pasiran dan juga gambut. Selain itu digunakan juga data sekunder berupa hasil sensus sarang rayap 2 tahun sebelumnya serta data pengendalian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan hasil sebagai berikut yang dipaparkan pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah dan jenis rayap yang ditemukan

Jenis Tanah	Blok Sampel	Jumlah Sarang Rayap	Jenis Rayap Yang Ditemukan	Habitat			Tingkat Serangan
				Menempel Pada Pokok Sawit	Gawangan Mati	Kayu Lapuk	
Mineral	L-59	82	<i>Macrotermes gilvus</i>	48	28	6	Tidak ada serangan
	L-60	101	<i>Macrotermes gilvus</i>	60	34	7	Tidak ada serangan
Pasiran	N-49	6	<i>Macrotermes gilvus</i>	5		1	Tidak ada serangan
	N-50	8	<i>Macrotermes gilvus</i>	6		2	Tidak ada serangan
Gambut	Q-52	5	<i>Macrotermes gilvus</i>	4		1	Tidak ada serangan
	Q-53	6	<i>Macrotermes gilvus</i>	6			Tidak ada serangan

Tabel 1 menunjukkan jumlah sarang rayap yang ditemukan pada tanah mineral memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sarang rayap yang ditemukan pada tanah pasiran dan gambut. Rayap membutuhkan lingkungan yang lembab untuk bertahan hidup. Tanah mineral cenderung memiliki tingkat kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah gambut dan tanah pasir. Tanah gambut sering kali memiliki drainase yang buruk, sementara tanah pasir dapat dengan mudah mengering karena air cepat meresap (Costa, L. 2019).

Tanah mineral memiliki struktur yang lebih padat dan lebih baik untuk membangun sarang dibandingkan dengan tanah gambut dan pasiran. Struktur padat ini menyediakan tempat yang lebih aman dan kokoh untuk koloni rayap berlindung dan berkembang biak. Struktur ini dipengaruhi oleh komposisi penyusun tanah yakni lempung. Tanah lempung yang memiliki tekstur halus dan berbutir kecil, adalah pilihan yang ideal karena mudah dibentuk dan diperkeras oleh rayap untuk menciptakan struktur yang kuat (Arif, 2020).

Selain karena faktor kelembaban tanah ketersediaan sumber makanan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi habitat rayap. Tanah mineral cenderung memiliki lebih banyak sumber makanan berupa serat tumbuhan yang terdekomposisi dan bahan organik, karena tanah mineral lebih kaya nutrisi dibandingkan dengan tanah gambut dan tanah pasir (Weil & Brady, 2017). Faktor lain adalah karena tanah mineral mengandung lebih sedikit bahan organik dibandingkan dengan tanah gambut. Bahan organik cenderung mempengaruhi sifat tanah dengan menyediakan ikatan yang lebih lemah antara partikel-partikel tanah, yang mana hal ini menyebabkan tekstur tanah menjadi lebih longgar, remah dan gembur (Sertua dkk, 2014).

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa spesies rayap yang ada di Tangar Estate hanya ada satu jenis spesies yakni *Macrotermes gilvus*. *Macrotermes gilvus* adalah salah satu jenis rayap pemakan kayu yang termasuk dalam famili Termitidae dan genus *Macrotermes*. Spesies ini dikenal dengan beberapa nama umum, seperti termes kuning atau termes raja kuning. *Macrotermes sp. M. gilvus* memiliki ciri

bentuk kepala persegi panjang, memiliki mandibel, dan memiliki pronotum (Rafli et al., 2021). Spesies *Macrotermes gilvus* (Mayor) yang ditemukan memiliki ciri-ciri morfologi yaitu warna kepala cokelat kemerahan (Pawana, 2017).




Gambar 1. *Macrotermes gilvus*

Spesies rayap ini tidak menimbulkan kerusakan fisik pada tanaman yang masih hidup hal ini juga dibuktikan pada penelitian ini. Setelah dilakukan pembongkaran pada sarang rayap yang menempel di pokok kelapa sawit diketahui bahwa bagian pokok yang ditempel oleh sarang rayap tidak terdapat kerusakan fisik apapun. Spesies rayap *Macrotermes gilvus* dinilai menjadi hama pada tanaman budidaya dikarenakan kemampuannya membuat sarang, yakni apabila rayap ini membuat sarang didekat perakaran tanaman kelapa sawit dapat menyebabkan perakaran tanaman terganggu sehingga tanaman menjadi doyong/miring (Pawana, 2017). Namun hal ini tidak ditemukan pada penelitian ini, hal ini diduga karena tanaman kelapa sawit yang ada di Tangar Estate adalah tanaman menghasilkan yang tergolong sudah cukup tua yang mana perakarannya juga sudah berkembang sempurna sehingga perakarannya lebih kokoh dan tidak terpengaruh oleh sarang rayap yang menempel pada pokok sawit.

Pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Pribadi, T (2015) ditemukan juga jenis rayap yang lain yakni *Coptotermes curvignathus*, namun pada penelitian ini tidak ditemukan jenis rayap tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi keanekaragaman spesies dalam suatu areal adalah kondisi geografi atau tipe tanah. Cheng et al. (2008) menyatakan bahwa lahan dengan tipe tanah mineral akan didominasi oleh anggota suku Termitidae kemudian menurun jumlah anggota suku Termitidae pada lahan yang didominasi gambut.

Penyebaran sarang rayap



Gambar 2. Penyebaran sarang rayap di tanah mineral (a) Blok L-59 (b) Blok L60

Keterangan : Titik merah pada *stripple card* menandai posisi sarang rayap

Dari gambar 2 diketahui penyebaran habitat rayap pada tanah mineral tidak merata atau cenderung mengelompok yakni sebaran habitat rayap yang ditemukan mengelompok pada bagian barat. Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa tekstur tanah pada bagian barat blok memiliki tekstur yang lebih liat dibandingkan dengan bagian timur hal ini juga dapat kita lihat pada peta semi detail yang tersedia pada arsip kebun. Berdasarkan peta semi detail kebun Tangar, diketahui bahwa bagian barat pada blok L-59 dan L-60 memiliki tekstur liat berdebu sedangkan pada bagian timur blok bertekstur cenderung lempung berpasir.

Tekstur tanah lempung berpasir memiliki tekstur yang kasar, hal ini dikarenakan komposisi fraksi penyusun tanah ini sendiri yang mana tanah ini terdiri dari 7% tanah lempung, 50% pasir, dan 43% lanau. Tekstur tanah liat berdebu cenderung lebih halus dibandingkan dengan tanah liat berpasir. Hal ini diakrenakan kandungan lempung yang dimiliki oleh tanah liat berdebu yang lebih banyak yakni sekitar 37.5% (Hanafiah, K.A. 2005) Rayap *Macrotermes gilvus* memerlukan lempung untuk membuat sarang karena tanah lempung yang memiliki tekstur halus


dan berbutir kecil, adalah pilihan yang ideal karena mudah dibentuk dan diperkeras oleh rayap ini untuk menciptakan struktur yang kuat (Arif, 2020).



Keterangan : Titik merah pada *stipple card* menandai posisi sarang rayap

Gambar 3. Penyebaran sarang rayap di tanah pasiran (a) Blok N-48 (b) Blok N-49

Dari gambar 3 diketahui bahwa sebaran sarang rayap yang ditemukan pada jenis tanah pasiran cenderung acak. Penyebaran secara acak dapat terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya yakni apabila lingkungan sangat seragam dan tidak ada kecenderungan untuk berkelompok (Arifin. dkk, 2014). Hal ini juga didapati pada penelitian serupa yang dilakukan oleh Johari, A (2021) yang mana pola sebaran isoptera pada perkebunan kelapa sawit ditemukan secara acak.



Gambar 4. Penyebaran sarang rayap di tanah Gambut (a) Blok Q-52 (b) Blok Q-53
Keterangan : Titik merah pada *striples card* menandai posisi sarang rayap

Dari gambar 4 diketahui bahwa sebaran sarang rayap yang ditemukan pada tanah gambut adalah menyebar secara acak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa vegetasi pada perkebunan budidaya kelapa sawit adalah vegetasi yang homogen yang mana hal ini disebabkan oleh teknis budidayanya yang monokultur. Selain itu pada blok sampel tanah gambut diketahui berdasarkan peta semidetil arsip kebun Tangar bahwa jenis tanah pada blok sampel ini homogen pada keseluruhan blok sampel yakni teridentifikasi sebagai gambut saprik. Selain itu rayap tidak memiliki kecenderungan untuk membentuk kelompok antar koloni yang mana hal ini menyebabkan koloni rayap yang mandiri tanpa perlu interaksi antar koloni.


Untuk pengendalian rayap yang dilakukan di perkebunan Tangar sendiri adalah dengan pengendalian mekanis yakni pekerjaan buru sarang rayap. Pengendalian ini dilakukan dengan cara membongkar sarang rayap dengan menggunakan cados, lalu ratu rayap yang ada di dalam sarang dikumpulkan dan dibawa ke kantor divisi sebagai bukti kerja untuk selanjutnya dimusnahkan. Untuk pengendalian ini sendiri dilakukan rutin dengan rotasi sekali setahun.

Sebelum pengendalian ini dilakukan, terlebih dahulu dilaksanakan sensus untuk mengetahui jumlah dan letak sarang rayap pada setiap blok. Data sensus sarang rayap dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2. Data sensus sarang rayap tahun 2021 s/d 2023

Jenis tanah	Blok	Jumlah sarang rayap		
		2021	2022	2023
Mineral	L-59	87	86	82
	L-60	115	103	101
Pasiran	N-49	15	9	6
	N-50	17	10	8
Gambut	Q-52	15	6	5
	Q-53	14	6	6


Tabel 2 merupakan rekap dari data penyusunan sarang rayap yang dilakukan dua tahun ke belakang. Untuk mempermudah pembacaan data tersebut disajikan kedalam grafik berikut.



Gambar 5. Grafik jumlah sarang rayap di tanah mineral tahun 2021-2023



Gambar 6. Grafik jumlah sarang rayap di tanah pasiran tahun 2021-2023



Gambar 7. Grafik jumlah sarang rayap di tanah gambut tahun 2021-2023

Ketiga grafik diatas menunjukkan bahwa populasi / jumlah sarang rayap di Tangar Estate cenderung menurun, hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian yang telah dilakukan tergolong efektif. Pengambilan ratu dapat menghentikan pertumbuhan rayap hal ini dikarenakan peran ratu yakni memproduksi telur untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan koloni rayap, selain itu pembongkaran sarang rayap ini juga dapat menyebabkan rayap manjadi terpisah dari koloninya yang mana seperti yang diketahui bahwa rayap adalah serangga social yang saling bergantung pada setiap kasta di dalam koloni nya terutama kasta pekerja (Astuti, 2020). Selain itu rayap yang tidak berada pada sarang akan mudah untuk dehidrasi dan mati mengering serta terekspos oleh musuh alaminya yakni semut, capung, kalajengking, katak, burung pemakan serangga, dan juga binatang mamalia seperti kalelawar pemakan serangga (Nandika et al.2003).

15 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Populasi rayap terbesar pada jenis tanah mineral
2. Jenis rayap yang ditemukan adalah *Macrotermes gilvus*, rayap ini tidak memberikan dampak kerusakan fisik pada tanaman kelapa sawit

3. Pengendalian mekanis yang dilakukan sudah cukup efektif menurunkan populasi rayap di Tangar Estate

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Dahlan, Z., Sabaruddin., Irsan C., & Hartono, Y. (2014). Characteristic, morphometry dan spasial distribution of population of subterranean termites *Macrotermes gilvus hagen* (Isoptera: Termitidae) in the rubber plantation land habitat which managed without pesticied and chemical fertilizer. *Internationel Journal of Science and Research (IJSR)*, 3(4), 2319- 7064.
- Arif, A. (2020). *Rayap : Peran Biologi, Pencegahan & Pengendaliannya*. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin, Makassar.
- Bakti, D. (2004). Pengendalian rayap *Coptotermes curvignathus* Holmgren menggunakan nematoda *Steinernema carpocapsae* Weiser dalam skala laboratorium. *Jurnal Natur Indonesia*. Vol 6(2) : 81-83.
- Cheng S, Kirton LG, Gurmit S. (2008). Termite attack on oil palm grown on peat soil: identification of pest status and factors contributiing to the problem. *Planter* 84: 200-210.
- Costa-Leonardo, A.M., 2018. The Exoskeleton of Termites (Isoptera): A Review, *Sociobiology*, 50(1), 1-19
- Johari, A. Adawia, R,A. Wulandari, T. (2021). Tipe Sarang Dan Sebaran Jenis Rayap (Isoptera) Di Hutan Kota Dan Perkebunan Sawit Wilayah Jambi. *AL-KAUNIYAH: Jurnal Biologi*, 15(2), 2022, 191-198
- Nandika, D., Rismayadi, Y., dan Diba, F. 2015. *Rayap Biologi dan Pengendaliannya*. Edisi Kedua. Muhammadiyah University Press. Surakarta
- Nandika, D. (2014). *Rayap Hama Baru di Kebun Kelapa Sawit*. Bogor: SEAMEO BIOTROP
- Pawana, C. (2017). *Pengukuran Populasi Rayap Tanah dan Teknik Pengendaliannya Menggunakan Termitisida Berbahan Aktif Fipronil pada Perkebunan Kelapa Sawit Milik Rakyat di Kabupaten Mesuji Lampung*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Prasetyo KW dan S Yusuf. (2005). *Mencegah dan Membasmi Rayap Ramah Lingkungan dan Kimiawi*. Agromedia Pustaka, Jakarta
- Pribadi, T. (2015). Kelompok fauna rayap pada areal pertanaman kelapa sawit di Katingan, Kalimantan Tengah. *Jurnal PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON* Volume 1, Nomor 3. DOI: 10.13057/psnmbi/m010330
- Rafli, M. A., Madusari, S., & Soesatrijo, J. (2021). Komparasi Efektivitas Metode Pengendalian Rayap *Macrotermes Gilvus* Di Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal*

Agrosains Dan Teknologi, 5(2), 77. <https://doi.org/10.24853/jat.5.2.77-86>

Sertua, H., Lubis, J.A. dan Marbun, P. 2014. Aplikasi kompos ganggang cokelat (*Sargassum polycystum*) diperkaya pupuk N, P, K terhadap Inseptisol dan jagung. *Jurnal Online Agroekoteknologi*. 2 (4): 1538 – 1544

Savitri, A, Martini, Sri Yuliawati. 2016. Keanekaragaman Jenis Rayap Tanah dan Dampak Serangan Pada Bangunan Rumah di Perumahan Kawasan Mijen Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 4 (1) : 100-105.

Yatina, E. M., F. X. Susilo dan M.H. Agus. (2006). Serangan dan Populasi Rayap pada Pohon Karet, Kelapa Sawit dan Mojokeling. <http://www.unila.ac.id/fp>.

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.instiperjogja.ac.id Internet Source	3%
2	repository.unri.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.instiperjogja.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	2%
5	biodiversitas.mipa.uns.ac.id Internet Source	1%
6	doaj.org Internet Source	1%
7	jurnal.untan.ac.id Internet Source	1%
8	Noorwahid Sofjan. "The Dilemma of Corporate Social Responsibility (CSR); Case Study of PT. Inco", Madika: Jurnal Politik dan Governance, 2021 Publication	1%

9	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
10	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %
11	jurnal.unej.ac.id Internet Source	1 %
12	jurnal.umj.ac.id Internet Source	1 %
13	"Termites and Sustainable Management", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	1 %
14	Submitted to Universiti Malaysia Sabah Student Paper	1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On