

KESIMPULAN

Terbatas pada penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan

1. Penggunaan mulsa tandan kosong kelapa sawit, cangkang, dan daun kelapa sawit memberikan pengaruh yang sama terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di *pre nursery*.
2. Penggunaan mulsa ketebalan 0 cm atau tanpa mulsa sama baiknya dengan ketebalan mulsa 2 cm dan 4 cm dalam menghambat pertumbuhan gulma.
3. Penggunaan mulsa dengan ketebalan 0 cm, 2 cm dan 4 cm sama baiknya dalam menjaga kelembapan, karena penyiraman yang dilakukan sudah mencukupi.

SARAN

Dalam penelitian ini disarankan :

1. Menggunakan mulsa yang sudah kering terutama pada mulsa tankos, karena pada ketebalan 4 cm jika menggunakan mulsa yg basah rawan menjadi sarang hama.
2. Mengaplikasikan mulsa pada umur 4 minggu atau benih sudah tumbuh setidaknya 4 – 5 cm, agar tidak tertutup oleh mulsa.
3. Penanaman benih dilakukan pagi hari lalu disiram agar tidak langsung terkena paparan matahari pada siang hari.