

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang didapatkan dari penelitin ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diketahui jenis gulma di kebun kopi robusta jenis, *Ceratostigma plumbaginodes*, *Oplismenus burmani*, *Paspalum conjugatum*, sedangkan jenis gulma dominan di kebun arabika adalah *Kalimeris indica*, *Axonopus compressus*, *Erigeron sumatrensis*.
2. Diketahui gulma dominan yang tumbuh di kebun kopi robusta adalah gulma daur hidup tahunan dengan morfologi rumputan, sedangkan di kebun kopi arabika adalah gulma daur hidup tahunan dengan morfologi daun lebar.
3. Komposisi gulma di kebun kopi robusta dan arabika sangat berbeda atau tidak seragam sehingga pengendalian yang dilakukan berbeda.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi para petani, pengendalian gulma sebaiknya dilakukan berdasarkan jenis gulma dominan yang tumbuh di kebun kopi robusta dan arabika.
2. Terkait daur hidup di kebun kopi robusta dan arabika, dilakukan pengendalian gulma secara mekanis dengan pembajakan periodik waktu 2 – 3 minggu, sementara untuk cara kimiawi dilakukan dengan herbisida kontak.