

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan analisis dapat diambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*) dijumpai pada setiap blok TBM dan TM kelapa sawit.
2. Keberadaan hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*) dipengaruhi oleh ketersediaan pakan yang melimpah dan rumah sebagai tempat tinggal yang baik bagi (*Oryctes rhinoceros*).
3. Pada areal TBM bekas *chiping* kelapa sawit menjadi tempat yang dominan dijumpai hama kumbang tanduk (*Oryctes rhinoceros*), sementara pada areal TM dominan dijumpai pada bekas aplikasi TKKS.
4. Pengendalian dengan ferotrap dan kutip manual (larva) memberikan hasil yang lebih baik daripada pengendalian dengan semprot *sipermetrin* dan aplikasi kapur barus.

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran untuk tetap mempertahankan cara aplikasi TKKS agar tidak lebih dari satu lapis, penyincangan pokok tumbang dengan baik dan meningkatkan kedisiplinan setiap pemanen khususnya dalam penyusunan pelelah digawangan mati. Penulis juga berharap agar setiap pekerjaan tetap dipantau dan berjalan sesuai standar yang ada.