

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlakuan pemberian 2 butir umpan Racumin menghasilkan rata-rata jumlah umpan yang termakan tertinggi, yaitu sebesar 17,00 butir dibandingkan dengan perlakuan pemberian 1 butir 2,75 butir dan 3 butir 15,50 butir.
2. Perbedaan jumlah umpan Racumin yang di berikan 1 butir, 2 butir, dan 3 butir per pokok tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah Racumin yang termakan oleh tikus. Hal ini ditunjukan dengan nilai signifikansi sebesar 0,369 yang lebih besar dari taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$).

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu selanjutnya disarankan menggunakan jumlah ulangan yang lebih banyak serta waktu pengamatan yang lebih lama agar diperoleh hasil yang lebih akurat dalam mengetahui pengaruh perbedaan pemberian jumlah umpan pada Racumin. Selain itu disarankan juga untuk penggunaan Racumin di kebun kelapa sawit juga di sesuaikan dengan kondisi di lapangan, serta tingkat serangan tikus nya.