

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Aplikasi fungisida berbahan aktif propineb belum memberikan pengaruh nyata terhadap persentase daun terinfeksi pada bibit kelapa sawit. Persentase daun terinfeksi pada setiap perlakuan cenderung mengalami perubahan yang relatif kecil selama periode pengamatan, dengan kondisi awal antar perlakuan yang belum seragam.
2. Aplikasi fungisida berbahan aktif propineb belum memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit yang ditunjukkan melalui tinggi batang dan jumlah daun baru.
3. Aplikasi fungisida berbahan aktif propineb menunjukkan pengaruh terhadap kemampuan mempertahankan daun baru tetap tidak terserang pada minggu ke-2 dan ke-3.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan waktu pengamatan yang lebih lama agar pengaruh fungisida berbahan aktif propineb terhadap penyakit bercak daun dan pertumbuhan bibit kelapa sawit dapat diamati dengan lebih jelas. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mencoba variasi dosis fungisida atau mengombinasikannya dengan metode pengendalian lainnya sehingga diperoleh cara pengendalian penyakit bercak daun yang lebih efektif pada pembibitan kelapa sawit fase *Main Nursery*.